ann a la com<mark>alimita di mini di mita di mita d</mark>

Rigolbonilli

Vass4R01s541-545





Collection Vassal-Montpellier

0Mtp967


Rigolbonilli 8 R 10 s. 86.90




duntumbuntumbuntumbuntumb



domindomindomindomind



dontadoutodoutodoutod



dinambantandantandantand

DESIGNATION: Rigolborrilli CLOS 8 PLANCHE SO RANG Souche 86.90 Vigueur: 25 PORT : érig - 2 érig - couché Hillerandage: 0,5 28.7.86 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 16 <u>GRAPPE</u> : G - (M) - P : L - H - C BAIE : TG - (6)- M - P 21-21 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov - cyl. - fus. COULDUR : Gr - RB - H SAVEUR : m - ar - fox - herb. CHARGE : 516 s20 avec pépins - apyrène 830 JUS inc. - coloré

Los 8 RANG 10 Souche 86-90 Désignation : Rigolbenilli CHARGE : Année : 25.7 Véraison : 22.8.88 Maturité : Mill.: 0 Pour.: 0 GRAPPE : G -(M)- P - Dim. : 16 Vigueur: 25 PORT : érig - (1/2) érig - couché) Année : TG - G - M - P - Dim. : 20 4 19 disc -sph.-ell. fov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb. s1 5 Avec pépins - apyrène s2 3 JUS inc. - coloré 33 2 34 5

Année: 1986 Emplacement... 3. R.10. A. 86.a. 90. Désignation. Rigolbonilli...

	Nombre Fotal	DATES							
1	d'yeux	243	: 28,3 :	1	1 1	1 1	!		
1 8		1	1 1	1	1	1	1 1		
1 2 %		1			1	1 1	1		
3 8		!	!!!!!!	1	. !	1	Tree And		
1 4	4	1 /	2 ×	!	1 1	1 1	!		
1 5	5	! 1	1 2 1	1 1	1 1	1 1	1		

D le 28.3.86 +3

DESIGNATION: Rigolbonilli

DEPLACE ENT: 9 RIOD 86.90

Date de la vendange: 9.9 86 (+3)

Poids de la vendange: 3400 04350

Nombre de souches: 4 (212g)

Dimbre de grappes: 16

Pourriture: 16/0

Couleur: Rose en Blane.

Indice refract.: 19.4 (1009)

Acidité du moût: 4,3

Decuver Date: 159

Date: 16.9

Niso en bouteille
Densité: 996

Degré alcoolique : M,º1

Acidité du vin :4,5

Date de Dézustation: 5.1,87

OBSERVATIONS: Classe: 2,1

NOM Rigolbonilli s

EMPLACEMENT 8 RAO & 86.90

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
2		27.3		2 4								
3 4 5	4 4 3	27.3 31.3 31.3	31.3 3.4 3.4	2 7 1		4,6	9,6	16,6	27.7	307	3-8	8,9 t3
	20		°.4 +6	16	8		9,6				V	erige

NOM Rigolbonilli se

EMPLACEMENT 8 Rio 186.90

NOM Rigolb-onilli

EMPLACEMENT 8 R101 86.90
4 K1 1 541 545

ouche	Nbre yeux		rrement mI/déb		Ferti- lité	The second secon	raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	44464			12144	5,4	24.5 24.5 22.5 22.5 24.5	24.5	305	17.7	247	18	
Pourriture: 20% Mill.: O Port: Mui euge Vigueur: 3												

DESIGNATION : EMPLACEMENT : Rigolbonilli cl 8 R 10 2 - 86, 90 (287)

### (A) BOURGEONNEHENT

#### Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)duveteuses 8) cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé. la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée. Rigolbonilli Clos 8 R. Los. 86-90 (5.87)

Désignation : Emplacement :

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre A - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - de duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERFACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Rigolbonilli clos 8 R 10 s-86-90 (s.87)

Désignation : Emplacement :

Colonne

## RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

leg- colorées 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.)

: coloré 7 - vert 8 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

#### FLEUR (I)

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvost

Rigolbonilli.

Désignation : Emplacement : clos 8 R 10 s. 86-90 (090)

#### FEUILLE ADULTE

#### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2- grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure . nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbr : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (l'a tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte () - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Cest edories au foint fétiplaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long ()- moyen ()- court 3.

39 - glabre () - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement ()

40 - aranéeux 4 - duvoteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

Calvo85

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Rigolbonilli 8 Rro s-86-90 3-90

#### GRAPPE

Crosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions: 16x ). Lache 71 - Moyenne 72 - Compacte (13) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81)

#### BAIE

Très grosse 82 - Grosse (83) - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :21 x 21). De couleur blanc gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée (93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - anquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière (07) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1). A saveur neutre 🕼 - fade 113 - musquée 🎶 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte (2) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29]. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134). A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec peping - apyrène.

# Formulaire de description 5/8

(maturité) Observateur: Lacombe Innée : 1998 Code cépage Code clone Emplacement 8 R10 5 86.96 Nom cépage : Kigolbonilli Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm)(3)- moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9 oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. 20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5- compacte 7 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2) oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) (7) très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 7- uniforme 3 oiv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3)- ovoide 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7) - tres épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent (1) apparent 2. oiv 230\* coloration de la pulpe : non colore (1) coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non colorée 12 coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune 1 - goût muscat@- goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. oiv 236\* saveur: aucune 1 - goût muscat 2- goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm/3) moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (> 10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 81)- coloré 80.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) présentes 2

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9

Régolbonille 7 × 10 186.90 (0.87) DENOMINATION : EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvore

N° d'ordre :
Désignation : Rigolbonilli
Emplacement :
8R105.86.90

: 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - (1) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües